

Der er nu stort hjortevildt overalt i Danmark.
Tallene i den årlige hjortevildtoversigt
opgøres i øvrigt på en ny måde.

Tekst: Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund
Foto: Jens Kristian Kjærgaard m.fl.

HJORTEVILDTOVERSIGTEN 2012

Hjortevildt overalt



> I 1942 BLEV den første oversigt over kronvildt bragt i Dansk Jagttidende. Titlen var Jyllands Kronvildt, og bestanden blev opgjort til ca. 1.850 dyr. Meget er sket siden - både med kronvildtets antal og udbredelse, men så sandelig også med oversigterne. I de sidste mange år er oversigterne udarbejdet af Robert Vestergaard Olsen, som med sidste års oversigt takkede

af som ankermand på denne jagtlig institution.

Metoden

Årets hjortevildtoversigt omhandler både då- og kronvildt og kun bestande, som ikke er under hegn. Estimatene, som oversigten er baseret på, er tilvejebragt af de 12 regionale hjortevildtgrupper. I grupperne er jord-

bruget, Danmarks Jægerforbund og andre grønne organisationer repræsenteret. De estimer, som grupperne har afrapporteret til Vildtforvaltningsrådet, er således de bestandstal, som de relevante forvaltningsaktører er enige om. Endvidere er disse bestandsopgørelser ikke længere knyttet op på ejendomme, men på egne. Bestandene er opgjort før

Kronvildt					
Område	Estimat	Udvikling	Område	Estimat	Udvikling
Nordjylland	1.800		Stubbesø	200	↑
Thy	500-600	↑	Rougsø	25	↑
Østerild	300	↓			
Tranum	500-600	↑	Syddjylland	4.350	
Nordøstvendssyssel	400	→	Oksbøl	1.400	→
			Vorbasse-Hovborg	900	↑
Himmerland	1.015		Sdr. Omme	700	↑
Vesthimmerland	40-50	↑	Birkebak, Høgildgaard m.fl.	450	↑
Sydhimmerland	10-20	↑	I øvrigt	900	
Rold Skov	900	↓			
Østhimmerland	20	↑	Sønderjylland	1.365	
Mariager-Randers	30-40	↑	Als	15	↑
			Bommerlund og Frøslev	350	→
Vestjylland	4.300		Aabenraa til Haderslev	50	↑
Klosterheden	550	↗	Skærbæk til Toftlund	400	↑
Feldborg	550	↗	Løgumkloster til Tønder	100	↑
Ulborg	3.200	→	Omkring Gram	400	↑
			Nord for Rørring	50	↑
Midtjylland	3.035				
Hammel-Bjerringbro	650-700	↑	Sydsjælland	545	
Kompedal-Myremalm	370-400	↑	Saltbæk Vig	150	↑
Gludsted, Nørlund, St. Hjællund og Skærbæk	1500-1600	↑	Åmosen	300	↗
Hastrup, Rørbæk og Mattrup	350-400	→	Holmegaard og Gisselfeld m.fl.	70	↑
Odder	50	→	Øst for Ringsted	14	↑
			Hvalsø-skovene	10	↑
Djursland	2.450		Nordsjælland	235	
Emmedsbo-Sostrup	250	↑	Halsnæs	20-25	↑
Meilgaard	350	↓	Tisvilde	35-45	↑
Fuglsø Mose og Ramten Skov	650	→	Valby Hegn	75-85	↑
Løvenholm, Fjeld og Brunmose	650	→	Harager Hegn	70-75	↑
Skaføgaard	250	↑	I øvrigt	25-35	↑
Rosenholm	50	→			
			Samlet forårsbestand 2012	19.095	

Dåvildt					
Område	Estimat	Udvikling	Område	Estimat	Udvikling
Nordjylland	1.370		Himmerland	485	
Thy	120	↑	Trend	100	↑
Østerild	4-500	↑	Livø	130	↑
Tranum	400	↑	Østhimmerland	30	↑
Nordøstvendssyssel	400	→	Hobro til Hadsund	150	↑
			Mariager-Randers	75	↑

kalvesætning. Det vil sige, at bestandene umiddelbart før jagtsæsonens start som tommelfingerregel vil være en tredjedel større end de her anførte.

Nordjylland

Nord for Limfjorden oplyses om fire delbestande af kronvildt: området omkring Nationalpark Thy, Østerild-området, området omkring Tranum

og det nordøstlige Vendsyssel.

I Thy og Tranum-området opleves en fremgang i bestandene, og særligt omkring Hanstholm Reservatet har der været eksempler på markskader. Den bestandsmæssige fremgang i disse områder kædes delvist sammen med, at bestanden i Østerild-området er faldet. >

Mangler der dyr i opgørelsen?
Sidder du med oplevelsen af, at hjortevildtoversigten er mangelfuld for det område, hvor du bor eller jager, så kontakt den regionale hjortevildtgruppe, og kom med dine input. Du kan finde kontaktinformationerne på siden: www.jaegerforbundet.dk/?id=763.

Dåvildt (fortsat)

Område	Estimat	Udvikling	Område	Estimat	Udvikling
Vestjylland	1.220		Langeland	2.200	↗
Klosterheden	270	↑	Middelfart inkl. Wedellsborg	600	↑
Idom	110	↑	Nordfyn inkl. Æbelø	500	↑
Sørvad	50-65	↑	Nyborg	500	↑
Vinderup-Mogenstrup	70-80	↑	Svendborg	300	↑
Ørre	200-230	↑	Sydvestfyn	720	↑
Stauning	120-130	↑	Midtfyn inkl. Ravnholt	500	↑
Nordøstsalling	100-110	↗	Tåsinge	150	↑
Nordfjends	50-60	↗			
Vestsalling	168-180	↗	Sydsjælland	1.500	
Skive-Rønbjerg	30-40	↗	Sorø og Bavelse-Næsbyholm		↑
			Gisselfeld og Holmegaard m.fl.		↑
Midtjylland	670		Jyderup-skovene		↑
Tjele	40-50	→	St. Svendstrup, Humleore og		
Kompedal	10-15	→	Hvalsø-skovene		↑
Silkeborg	150-160	↑	Bognæs og Boserup skov		↑
Samsø	250-300	↑	Vallø og Gl. Køgegaard		?
Juelsminde	180	↑	Lækkende		?
			Nordsjælland	1.250	
Djursland	875		Gribskov m.v.		→
Emmedsbo-Sostrup	250	↑			
Meilgaard	200	→	Lolland-Falster	1.770	
Fuglsø Mose og Ramten Skov	60	↑	Corselitze	75-100	↑
Løvenholm, Fjeld og Brunmose	120	↑	Naturstyrelsen Storstrøm	15-20	↑
Skaføgaard	225	↑	Frejlev-Sakskøbing	150	↑
Rosenholm	20	↑	Sydloolland	1100-1200	→
			Bursø	20-30	↑
Sydjylland	425		Vestloolland	10-15	↑
Oksbøl	125	↑	Nordvestjylland	10-15	↑
Vorbasse-Hovborg	125	↑	Christianssæde	150-200	↑
Sdr. Omme	50	↑	Rågå	80	→
Ansager	50	↑	Enehøje	50	↑
Nr. Nebel	50	↑	Fejø	10	↑
Trekantsområdet	25	↑			
			Bornholm	65	
Sønderjylland	880		Hele øen	50-80	↑
Als	250	↑			
Bommerlund og Frøslev	350	→	Samlet forårsbestand 2012	16.630	
Aabenraa til Haderslev	75	↑			
Haderslev til Kolding	175	↑			
Vest for Gram	30	↑			
Fyn	6.120				
Assens	200	↑			
Kerteminde inkl. Romsø	450	↑			

> Dette fald skyldes, at kronvildtet er vandret mod øst og sydvest i forbindelse med anlægningen af vindmøllecenteret.

For bestanden i det nordøstlige Vendsyssel meldes der om stagnation i bestanden. Den regionale hjortevildtgruppe gør endvidere gældende, at der var en del uheldige episoder omkring premieren på kronvildtjagten i området omkring Trynmose. Hjortevildtgruppen har sammen med Tannisbugt Hjortelaug været aktive for at forebygge lignende hændelser i den kommende jagtsæson.

Den nordjyske hjortevildtgruppe har rapporteret om fire delbestande af dåvildt. Disse områder er stort set

sammenfaldende med kronvildtbestandenes. Bestanden i Nordøstvendssyssel er stabil og har gennem lang tid haft jagttid. Bestanden er delvis et resultat af udslip fra en hjortefarm i 1991.

Bestandene i Thy og Hanherred er alle baseret på udsætninger inden for de sidste par år. Bestandene her har ingen jagttid, og der opleves nu store problemer med antallet af dyr og ikke mindst med dyr, som ikke har naturlig adfærd og skyhed over for mennesker. Derfor ønskes en åbning af jagttiden på dåvildt i dette område allerede i 2013.

Den nordjyske hjortevildtgruppe oplyser intet om de nye dåvildtbe-

stande i Sydøstvendssyssel og heller ikke om antallet af kronvildt i samme område.

Himmerland

Den samlede kronvildtbestand i forvaltningsområde Himmerland er opgjort til omkring 1.000 dyr. Størstedelen af bestanden står i Rold Skovkomplekset. Hjortevildtgruppen vurderer bestanden i Rold som faldende, men angiver samtidig, at der nedlægges for få hinde, og at hjortene nedlægges for unge, således at gamle hjorte mangler i bestanden. De øvrige bestande i Himmerland meldes i stigning. I området omkring Rønhøj plantage og de vesthimmerlandske heder er der ind-

En brølende brunsthjort fra Thy skræmmer en engpiper.



ført lokal jagttid, hvor hjorte med færre end ni sprosser samt hinder og kalve alle er fredet. Der er dog kendskab til, at der er nedlagt to hjorte i strid med denne fredning.

Der er oplyst om fem lokale bestande af dåvildt i Himmerland. Alle bestande oplyses at være stigende, samt at der er plads til flere dyr.

Vestjylland


Den vestjyske hjortevildtgruppe opgør kronvildtbestanden i tre delbestande, som er beliggende omkring de tre gamle statsskovdistrikter Ulborg, Klosterheden og Feldborg. Ulborg-bestanden oplyses at være stabil i antal, men at bestanden ligger over

områdets bæreevne. Afskydningen har i en årrække været domineret af hinder, hvilket er med til at begrænse produktionen. Dog opleves der større og større rudler, hvilket måske er udtryk for, at mange kalve er blevet moderløse - og dermed førerløse - i løbet af jagtsæsonen. Bestanden omkring Ulborg er samtidig præget af få modne hjorte.

Bestanden omkring Klosterheden opleves som svagt stigende. Den samlede afskydning af kronvildt er fornuftig i området. Retfærdigvis skal det dog nævnes, at Naturstyrelsen kompenserer for en afskydning med overvægt af hjorte uden for selve Klosterheden.

Omkring Feldborg-plantagerne og Ovstrup Hede opleves bestanden også som værende i stigning. Særligt i Ulborg og Feldborg-området er flere landmænd voldsomt plaget af markskader.

Hele det vestjyske forvaltningsområde har været underlagt en regional jagttid, som blandt andet gav septemberjagt på kalve. Samtidig er hjorte ældre end spidshjort med indtil ni sprosser fredet indtil 16. oktober. Endvidere er der kun jagttid på kalv, hind og spidshjort i januar måned. Dette har givet en markant forøgelse i afskydningen af spidshjorte. Ligeledes har der været flere eksempler på, at de hjorte, som har været fredet i



Den grønne graf viser dåvildtbestanden, som den er opgjort de seneste fire år af de regionale hjortevildtgrupper. Den samlede dåvildtbestand vurderes at være steget med knap 20 % årligt. De orange grafer viser udviklingen i kronvildtbestanden. Den fuldt optrukne linje er hjortevildtgruppernes estimater. Den stiplede linje er den bestand, som har været indberettet i de seneste tre kronvildtoversigter.

Dengang ...

Da Børge Alex-Hansen i 1942 udarbejdede den første oversigt, stod to tredjedele af det danske kronvildt i Himmerland. Bestanden omkring Oksbøl udgjorde ca. 150 dyr, og bestandene i plantagerne sydvest for Ulfborg var pga. markskader blevet halveret, så bestanden i området udgjorde 60 dyr.

Oversigten var fyldt med detaljerede oplysninger, og den var helt klart lavet ud fra tilgangen „God is in the detail“. Et eksempel: „*Natten mellem den 14. og 15. Marts var der spor af 2 Stkr. Kronvildt paa samme Egn...*“

Disse detaljer lod sig tilvejebringe, fordi nettet af informanter var enormt, og samtidig var der få dyr at holde styr på.

Og nu ...

Virkeligheden er løbet fra den måde at tilvejebringe data på. Der arbejder ikke længere det samme antal personer i skovene. Endvidere er mængden af det store hjortevildt blevet ganske overvældende mange steder. Udviklingen har nu gjort, at „Devil is in the detail“. Der er således stillet mange spørgsmål til troværdigheden af tallene i årenes hjortevildtoversigter, og der er ingen tvivl om, at de tal, som er blevet, og som vil blive bragt, er behæftet med en vis subjektivitet.



Det er afgørende, at hovedvægten af afskydningen ligger på de helt unge dyr som her en dåkalv t.v. og på modstående side en kronkalv.

september og første halvdel af oktober, desværre er skudt ned fra en kant af på fællesjagter i november og december. Henstillingen er fortsat at holde igen med afskydningen af hjortene samt en markant forøgelse af afskydningen af kalve.

Den regionale hjortevildtgruppe oplister i alt 10 lokale bestande af dåvildt. Bestandene syd-sydvest for Skive er alle baseret på udsætninger og har ingen jagttid. I disse bestande meldes om en bestandsstigning og dyr med uønsket adfærd og mang-

lende skyhed over for mennesker. Især bestanden ved Ørre giver udfordringer, idet denne bestand er blevet suppleret med dyr fra et større farmudslip. Hjortevildtgruppen ønsker jagttid på disse delbestande fra 2013.

De ældre bestande på Salling nord for Skive er underlagt frivillige restriktioner. Der er oprettet fire hjortelav til at sikre lokal forankring.

Midtjylland

I det midtjyske forvaltningsområde arbejdes der med fem lokale bestande af kronvildt. Bestandene ved Odder og syd for Nørre Snede vurderes at være stabiliseret. De øvrige tre delbestande meldes i stigning. Det gælder også bestanden i plantagerne nord for Nørre Snede med Gludsted og Nørlund som omdrejningspunkt. Netop dette område er plaget af markskader. Afskydningen i området vurderes stadig at være for lille. Endvidere



Ud af 1.228 kronstyr nedlagt omkring Ulborg i sidste jagtsæson er denne hjort fra Fejsø en af de største. Men hjorten vurderes ikke ældre end seks-syv år. Kun 37 af de nedlagte dyr var hjorte over fire år.



vurderes afskydningen i hele det midtjyske forvaltningsområde at være domineret af for mange hjorte og for få kalve. Gruppen overvejer derfor at indstille til en permanent fredning af seks-otteendere i hele forvaltningsområdet til den kommende jagttidsrevision.

I det midtjyske forvaltningsområde er der opgivet fem delbestande af dåvildt. Bestandene nord for Bjerringbro og vest for Kjellerup er ganske beskedne og vurderes som værende stabile i størrelse. Bestandene syd for Silkeborg, på Samsø og ved Juelsminde vurderes alle at være i fremgang.

Djursland

På Djursland vurderes der at være otte delbestande af kronvildt. Seks af disse bestande fordeler sig over det skovbælte, der løber diagonalt fra Hornslet i sydvest til Gjerrild i nordøst. Endvidere er der etableret en bestand på halvøen Rougsø. På Syd-djursland er bestanden omkring Stubbe sø i stærk fremgang. Landbruget på Djursland lider visse steder under markskader. Der arbejdes på at finde en model til at etablere aflastningsarealer. Gruppen henstiller til øget afskydning af hinder og særligt kalve samt skånsom og selektiv afskydning af hjortene. Gruppen ønsker spidshjortefredningen fortsat.

Dåvildtet opleves i de seks delområder, der dækker over skovbæltet. Fem af delbestandene vurderes at være i fremgang, kun bestanden mellem Fjellerup og Bønnerup vurderes at være stabiliseret.

Sydjylland

I Sydjylland angives fire kernebestande. Bestanden i Oksbøl-området vurderes stabiliseret omkring 1.400 dyr. I de tre øvrige kerneområder er bestanden fortsat i stigning. Gruppen vurderer, at der imellem kerneområderne står op mod 900 kron dyr. Gruppen oplyser, at der flere steder nedlægges for mange hjorte, men angiver samtidig, at der er en positiv udvikling, i form af at flere mellemhjorte skånes. Gruppen vurderer, at der kun er plads til flere dyr i skovkomplekset syd for Herning. I områderne både nord og syd for Grindsted forekommer der problemer med markskader.

Der er i forvaltningsområdet seks delbestande af dåvildt. Den største bestand findes omkring Vorbasse. Flere af de lokale dåvildtbestande er underlagt frivillig fredning, mens andre er totalfredet. Gruppen ønsker en kort jagttid i de områder, hvor der ikke er jagttid nu. Gruppen vurderer, at der er plads til flere dådyr i de områder, hvor bestandene i dag færdes.

Sønderjylland

I Sønderjylland nævnes syv lokale bestande af kronvildt. Den mindste findes på Als. Ellers er de lokale bestande hovedsageligt fordelt omkring de gamle Aabenraa og Linnet statskovdistrikter. Kun omkring Frøslev og Bommerlund vurderes bestanden at være stabiliseret; de øvrige lokale bestande meldes i stigning. For samtlige områder vurderes afskydningen af hjorte at være for hård.

I området kendes fem lokale bestande af dåvildt. Bestanden omkring Frøslev og Bommerlund har fuld jagttid, af de øvrige bestande er kun bestanden på Als åben for jagt. Gruppen ønsker lokal jagttid på bestanden syd for Kolding. Behovet for jagttid udspringer ikke af et ønske om at begrænse bestanden i antal, idet gruppen vurderer, at der er plads til flere dyr. Men enkelte dyr har udviklet en uønsket adfærd, som man gerne vil begrænse.

Netop uønsket adfærd, hvor flere individer var blevet en plage, ligger bag de 14 dages jagttid på en del af Als, som gruppen fik indført i jagttidsbekendtgørelsen fra 2011. Gruppen havde stor succes med at få egnens jægere til at samarbejde om en effektiv jagt på dåvildtet den 18. november 2011.

> Fyn

På Fyn har hjortevildtgruppen haft stor succes med at sikre lokal forankring ved at etablere hjortelav. På Langeland vurderes det, at bestanden ikke kan være større, da bestands-tætheden er vurderet til at være ét dådyr pr. 13 ha! I de øvrige bestande vurderes der stadig at være plads til flere dyr. Men gruppen følger nøje udviklingen med skader på jordbrug etc. De fleste bestande er underlagt en frivillig begrænsning i jagttrykket. Gruppen ønsker fortsat, at jagten skal reguleres ad frivillighedens vej. Dog ønskes der indført lokal jagttid på Tåsinge og justering af den eksisterende jagttid på Langeland.

Sydsjælland

Egentlig er Sydsjælland et misvisende navn for gruppen, idet hele Sjælland, bortset fra halvøen nord for linjen Roskilde-København, udgør forvaltningsområdet. Der er i området fem lokale bestande af kronvildt. Den største bestand findes omkring Åmosen syd for Mørkøv. Alle bestande meldes at være i stigning, hvilket skyldes en afdæmpet afskydning ad frivillighedens vej. Dog har der været eksempler på, at brodne kar har en selvskudt jagtudøvelse. Dette ses særligt i området mellem Næstved og

Haslev, hvor der også har været eksempler på, at nedlagt kronvildt er stjålet fra anden mands grund!

Dåvildt findes i stort set hele forvaltningsområdet på nær Odsherred. Dog er tyngden på syv kerneområder. Dåvildtbestanden opleves som stadig stigende, og der er begyndende markskader omkring Sorø-skovene og Næsbyholm-Bavelse.

Nordsjælland

Kronvildtet i Nordsjælland står primært i området nord for Hillerød og vest for Esrum sø. Gruppen oplever fire kerneområder, men kronvildt kan træffes i hele området. Bestanden er stigende, og afskydningen er moderat. Jagttiden i området er 16.-30. november. Gruppen angiver, at der bliver skudt for få hinder og kalve.

Dåvildtet står talstærkt i området med Gribskov som det store kerneområde.

Lolland-Falster

På Falster findes to lokale bestande af dåvildt, og begge bestande er i stigning. På Lolland med omkringliggende småøer vurderes der at være ni lokale bestande. Kun bestandene på Sydlolland og Rågåv vurderes at være stabile. De øvrige bestande meldes

stadig i stigning. Bestanden på Sydlolland giver markskader, men da skov- og landbrug ofte ejes af samme person, opleves det ikke som en særligt udtalt konflikt.

Bornholm

På Bornholm findes en mindre bestand af dåvildt. Der er jagttid fra 1.-15. januar på kalve. Der er på øen et generelt ønske om at få en større og mere geografisk fordelt bestand på øen.

Hvad er balancepunktet?

I kronvildtoversigten i 1981 var forårsbestanden opgjort til ca. 2.500 dyr, og man mente, at kronvildtbestanden var ved at nå balancepunktet. Over 30 år senere er den samlede forårsbestand nu opgjort til lige over 19.000 krondyr. Deraf må det sluttes, at balancepunktet er forskubbet over tid. Men er vi så tæt på nu? Af de jyske bestande vurderer hjortevildtgrupperne, at mere end halvdelen har et passende eller for stort antal krondyr. Der er med andre ord ikke mange steder i Jylland, hvor der vurderes at skulle være flere dyr.

En forårsbestand som den, der er opgjort af de regionale grupper, giver en bestand før jagtsæsonen på over 25.000 krondyr. Der har aldrig været



En stor del af kronvildtet findes i og omkring de jyske plantager.

opsat et mål for, hvor meget hjortevildt vi skal have i Danmark. Men målsætningen for bestandenes omfang, da hjortevildtgrupperne i 2004 blev nedsat, var at øge antallet af dyr og sprede bestandene til nye egne. Med årets opgørelse af då- og kronvildt må det siges, at arbejdet med disse to mål har været en succes. Dåvildt findes nu i stort set hele landet, og kronvildt findes mere eller mindre i de egne, som skønnes egnet til kronvildt. Mængdemæssigt er den igangværende forvaltning en bragende succes - med den effekt, at flere af grupperne nu melder om uacceptable markskader.

Markskader

Hjortevildt lever som bekendt af planter, og det foretrækker ofte velgødede og -vandede afgrøder. Derfor har der altid været en konflikt mellem skov- og særligt landbrug og hjortevildtet. En konflikt, som kulminerede i 1799, hvor Christian VII påbød alt kronvildt bortskudt. Et påbud, som gjorde, at kronvildtet forsvandt fra øerne, og hvor det kun med en håndsrekning fra få jyske herremænd overlevede i Jylland. Kronvildtet har siden fået lov til at brede sig, men spredningen har til stadighed affødt en heftig debat om markskader.

der. Da kronvildt i løbet af 1950'erne og 1960'erne etablerede sig fast i Gludsted plantage, vurderedes områdets bæreevne for en ny bestand nøje, og der blev opnået enighed om, at 20-30 stk. kronvildt var målsætningen „ud fra indtrykket, at en sådan bestand kan rummes uden skade af større betydning på plantage og omgivende agerbrug.“ Bestanden i Gludsted og omkringliggende plantager opgøres nu til 1.500-1.600 dyr!

Desværre har meget lidt ændret sig, siden Børge Alex-Hansen i den første kronvildtoversigt skrev: „Uviljen mod Kronvildtet er som tidligere nævnt ikke saa stor, at man ønsker dets Udryddelse - det være saa langt fra - men der maa og skal findes en Løsning vedrørende Markskaderne.“ 70 år senere er der stadig ikke fundet en løsning, og flere jyske landmænd hegner nu kronvildtet (og dermed også andet vildt) ude fra deres produktionsarealer.

Gruppernes lokalt tilpassede anvisninger for afskydning bør efterleves for at sikre en på alle måder bæredygtig forvaltning af då- og kronvildtet.

Afskydningen

Hvor mængden af hjortevildt er en succes i forvaltningen, halter det stadig efter med de mere kvalitative målsætninger om sikringen af en

mere naturlig køns- og aldersfordeling i hjortevildtbestandene. Mængden af hjortevildt reguleres igennem, hvor meget der nedlægges, men sammensætningen af bestanden bestemmes helt afgørende af, hvilke dyr der nedlægges.

Enhver afskydning af klovbærende vildt bør tilgodese nogle helt simple retningslinjer:

1. Hovedvægten skal ligge på de helt unge dyr (kalvene).
2. Afskydningen af handyr skal sikre, at en vis andel når kulminationsalderen (hos kronvildt 10-12 år, hos dåvildt 8-10 år).
3. Afskydningen af hundyr skal:
 - Stå i et rimeligt forhold til afskydningen af handyr.
 - Ske i forhold til den lokale målsætning om bestandens størrelse.
 - Ikke ske på bekostning af afkommet.

Grupperne har givet en række anbefalinger for afskydningen af de lokale bestande. Essensen af anbefalingerne er, at der generelt skydes for mange hjorte i en for ung alder. Samtidig skydes der for få kalve! Det er derfor bydende nødvendigt, at jægerne ændrer fokus fra at nedlægge hjorte til at nedlægge kalve for at sikre succesforvaltningens kvalitative målsætninger.

I området omkring det gamle Ulborg statsskovdistrikt, hvor der de sidste tre jagtsæsoner årligt er nedlagt over 1.000 dyr, udgør andelen af hjorte ældre end fire år mindre end tre procent af afskydningen. Intet tyder på, at det skyldes, at hjorte over fire år skånes, og derfor afspejler den ringe andel af voksne hjorte i udbyttet i bedste fald andelen af denne gruppe hjorte i bestanden.

Ses der på erfaringerne fra nu fire års kæbeindsamlinger på Djursland, er der i løbet af fire jagtsæsoner kun nedlagt ganske få hjorte på 10 år eller ældre. Jagttrykket på hjorte er ganske enkelt så højt, at det er rent held, hvis en hjort når at blive fuldt udviklet.

mf@jaegerne.dk

Fokus skal flyttes fra hjortene til kalvene. Kommer du i denne situation, så skyd en kalv!



Max Steinar